ПОТРЕБНА Е ИТНА НЕГА

ХЕРЕДИТАРЕН АНГИОЕДЕМ (ХАЕ): ХАЕ е ретка, потенцијално животo-загрозувачка болест, што ја предизвикува **недостаток на С1 инхибитор.** Често се поврзува со отоци на ткивото (едеми), што може да ги зафатат периферните делови од телото (раце, нозе), како и стомак, лице, врат и ларинкс. Повеќе информации може да добиете на www.haei.org

ОПСТРУКЦИЈА НА ДИШНИТЕ ПАТИШТА: Доколку не се третира, значително е голем **ризикот од смрт** како резултат на опструкција на дишните патишта. Ларингијалните, како и отоците на лице и на грло се **исклучително сериозни** и треба итно да се третираат. Доколку се загрозени дишните патишта, **искусен лекар треба да изврши интубација** врз пациентот**.** Освен тоа, треба да се достапни капацитети за итна трахеотомија.

БРЗ ТРЕТМАН: Со брзиот третман за кратко време доаѓа до прекин и повлекување на отоците и на тој начин се намалува морбидитетот и стапката на смртност.

ПРЕПОРАЧАН ТРЕТМАН:, Доколку не е достапна соодветна терапија за ХАЕ (С1-INH, екалантид, икатибант, треба да се користи плазма третирана со солвент детергент. Ако не е достапна, нападите треба да се третираат со смрзната плазма (доколку е безбедна). ХАЕ нападите **не реагираат на терапија** со глукокортикоиди, антихистаминици или епинефрин.

© HAEi. Information correct at July 2017

ОВОЈ ПАЦИЕНТ ИМА ХАЕ

Дијагноза Хередитарен ангиоедем

Diagnosis: ICD-10- D84.1

Медицинска картичка

Име:		Датум на раѓање:	
Државјанство:		Јазици:	
ЕМБ:		Алергии:	
Крвна група:		Тежина:	

Да се внесе информација кој третман е достапен или ако не е достапен третман

Д-р

Назив на болницата

00

Контакт лице за итни случаи

Во каков однос е пациентот со контакт лицето

00