



## ⚠️ ACIL YARDIM GEREKTİRİR! ⚠️ HAEi

**HEREDİTER ANJİYOÖDEM (HAÖ): HAÖ C1 İnhibitör eksikliğinden** kaynaklanan nadir ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. HAÖ atakları periferik bölgelerde (eller, ayaklar), karında, yüzde, boyunda ve larinkste dokularda şişlik (ödem) olarak görülür. Daha fazla bilgi için [www.haei.org/turkey/etc](http://www.haei.org/turkey/etc)

**HAVA YOLU TIKANIKLIĞI:** Eğer tedavi edilmezse, hava yolu obstrüksiyonundan dolayı **ölüm riski çok yüksektir.** Larinks, yüz veya boyun atakları oldukça ciddidir ve anında tedavi edilmelidir. Eğer hava yolu kapanırsa, hastaya deneyimli bir cerrah tarafından boğaza kanül yerleştirilmelidir. Ek olarak acil trakeostomi için hazır olunmalıdır.

**ANINDA TEDAVİ:** Anında tedavi atağın hafifleme sürecini hızla başlatır ve morbidite ve mortaliteyi düşürür.

**TAVSİYE EDİLEN TEDAVİ:** Eğer HAÖ'e özel tedavi (C1-INH, ecallantide, icatibant) mümkün değilse, lütfen solvent detergent plazma kullanın. Eğer o da mümkün değilse, atak taze donmuş plazma (güvenilir bir kaynaktan) ile tedavi edilebilir. **HAÖ atakları glucocorticoids, antihistamines ya da epinephrine ile yapılan tedavilere cevap vermez.**

© HAEi. Information correct at July 2017

## ⚕️ BU KİŞİ HAÖ HASTASIDIR! ⚕️

Hereditör Anjiyoödem Tanı Kodu: ICD-10- D84.1

Hasta Kartı HAEi

İsim: \_\_\_\_\_ Doğum Tarihi: \_\_\_\_\_  
Uyruk: \_\_\_\_\_ Dil: \_\_\_\_\_  
T.C.Kimlik No: \_\_\_\_\_ Alerji: \_\_\_\_\_  
Kan Grubu: \_\_\_\_\_ Boy/Kilo: \_\_\_\_\_  
Tedavi: \_\_\_\_\_



Dr.:

Hastane:

